Una empresa anasac

hortus

MOLE®

Reg. PQUA N° 1625 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENEREALES

MOLE es un fungicida de contacto, que protege a una diversidad de cultivos del ataque de Botrytis. Al ser usado en post cosecha, aumenta la vida de anaquel de vid, fresa, flores y otros.

MOLE no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendad en una pequeña cantidad de agua, luego remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FORMULACIÓN

MOLE es un fungicida formulado como suspensión concentrada que contiene 500 g de fenhexamid por un litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Hidroxianilida.

MODO DE ACCIÓN

MOLE, tiene acción sistémica localizada. A muy bajas dosis interfiere en el metabolismo del hongo, inhibiendo 4 diferentes estados de la enfermedad: Germinación de las esporas, elongación del tubo germinativo, formación del apresorio, crecimiento del micelio.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

MOLE®

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/Ha)	L/200L		
Vid	Pudrición	*Botrytis cinerea*	1.5 (1)	0.24	3	4
Arándano	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.5 - 0.6 (2)	0.25 - 0.30	1	5
Fresa	Podredumbre gris o Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.75 (3)	0.5	0	10
Palto	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.8 - 0.85(4)	0.20	33	0.01

PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.
(1) Vid: Gasto de agua de 1250 L/ha.
(2) Arándano: Gasto de agua de 400 L/Ha.
(3) Fresa: Gasto de agua de 300 L/Ha.
(4) Palto: Gasto de agua de 800 - 850 L/Ha.

RECOMEDACIONES

- ✓ Se aplica solo 03 vez por campaña por año. Desde la aparición de los primeros síntomas, durante la floración. Un segundo momento puede usarse en cierre de racimos o desarrollo de baya. Tercer momento de posible uso es en el cambio de color, llamado pinta.
- ✓ Se recomienda tener especial cuidado de no usar en uva vinífera o pisquera después de la pinta.
- ✓ Acondicionar el agua a un pH 5.5 – 6.0.
- ✓ Mantener la solución en constante agitación desde la preparación y durante la aplicación.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

MOLE®

COMPATIBILIDAD

MOLE puede ser usado solo o en mezclas o con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD

- ✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- ✓ Es Ligeramente peligroso - cuidado por lo que tiene banda se seguridad de color azul.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**