



Reg. PQUA N° 2362 – SENASA

# KILLTRIN®

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**KILLTRIN** es un acaricida agrícola que se usa para control de ácaros fitófagos, como araña roja, en diversos cultivos. Controla huevos, larvas y ninfas, no controla adultos. Es compatible con el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

## GRUPO QUÍMICO

Diphenyloxazoline

## FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN

**KILLTRIN** es un acaricida agrícola formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 110 gramos de Etoxazole por cada litro de producto formulado.

## MODO DE ACCIÓN

**KILLTRIN** actúa por contacto, no es sistémico. Es agonista de la hormona de la muda (inhibe la fijación de acetilglucosamina (GlcNA), que es precursor en la síntesis de quitina), en larvas de ácaros y áfidos. En los huevos impide la formación de órganos respiratorios. Tiene efecto transovárico y produce esterilización de las hembras adultas; los huevos puestos por hembras tratadas no son viables.



# KILLTRIN®

## CUADRO DE USOS

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.06	14	0.1
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus punicae</i>	0.06	1	0.01
Limón	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.06	14	0.1
Espárrago	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.02
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	21	0.5
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	1	0.5

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda usar KILLTRIN máximo UNA (01) vez por campaña por año.

### RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización.
- Use agua acondicionada a pH 5.5 – 6.0
- No use agua con alto contenido de carbonatos
- El suelo debe estar en capacidad de campo y la planta debe estar turgente.
- Evite aplica cuando haya agua libre sobre la superficie de las hojas.
- Es conveniente aplicar a primeras horas del día.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o suelos altamente permeables
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de lo menos 5 metros.
- No permitir animales en área tratada.

Fecha de última actualización: 15/12/2022

Página 2 de 3



# KILLTRIN®

- El aplicador debe emplear todas as medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar la lixiviación de aguas subterráneas.

## COMPATIBILIDAD

Es Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

## EFFECTO EN CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta a los cultivos siguientes si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

## SEGURIDAD

- No corrosivo, No inflamable, No explosivo.
- LIGERAMENTE PELIGROSO – CUIDADO. Tiene banda de seguridad de color AZUL.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.