Una empresa anasac

hortus

SURANO®

Reg. PQUA N° 1803 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SURANO es un fungicida cuyos ingredientes en su efecto combinado proporcionan una protección amplia contra las plagas. Se aplica como pulverización a la parte aérea de la planta con equipos convencionales como mochila manual o a motor.

FORMULACIÓN

SURANO es un fungicida formulado como suspensión concentrada (SC) que contiene 400 g de pyrimethanil y 100 g difenoconazole por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Pyrimethanil: Anilinopyrimidine

Difenoconazole: Triazoles.

MODO DE ACCIÓN

SURANO, es un fungicida sistémico y translaminar de acción protectante y curativa; erradicante y antiesporulante. actúa inhibiendo la secreción de enzimas requeridas para el proceso de infección, inhibe la extensión del tubo germinativo, el crecimiento micelio; además inhibe la síntesis de ergosterol, sustancia que forma parte dela membrana celular del hongo.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

SURANO®

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.65	-	67 (1) 14 (2)	4 (1) 3 (2)
Páprika	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.5 - 0.75	-	3 (1) 7 (2)	2 (1) 5 (2)
Alcachofa	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.15	7	0.01 (1) 1 (2)
Arándano	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.15 - 0.20	1	8 (1) 4 (2)
	Oidiosis	*Oidium sp*	-	0.15 - 0.20	1	8 (1) 4 (2)
Mandarina	Mancha marrón	*Cladosporium herbarum*	0.5 - 0.75	-	1	8 (1) 0.6 (2)
Palto	Cladosporium	*Cladosporium herbarum*	0.5 - 0.75	-	14	0.01 (1) 0.6 (2)

PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
(1) Pyrimethanil. (2) Difenoconazole.

RECOMENDACIONES

- En el cultivo de la vid, se puede aplicar como máximo dos (2) veces por campaña, con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. Cuando la presión de la enfermedad es fuerte, puede hacerse una aplicación en el intervalo, teniendo en cuenta que debe ser otro tipo de fungicida con un mecanismo de acción diferente.
- En el cultivo de páprika, se realizará solo una (1) aplicación por campaña y por año.
- Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el tanque del equipo que se va a utilizar hasta la mitad con agua, poner el agitador en marcha y agregar la dosis requerida. Finalmente completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo el agitador en marcha para lograr una solución homogénea, estos deben mantenerse funcionando durante toda la aplicación.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

SURANO®

- Utilice agua acondicionada a un pH 5.5—6.0.
- Mantenga el agitador del equipo en funcionamiento durante toda la aplicación.
- Utilice un volumen de agua que le garantice una buena cobertura.

COMPATIBILIDAD

Es Incompatible con productos con pH mayor a 11 o menor a 5.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 48 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**