

TOQUI



Reg. PQUA N°2350 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TOQUI es un fungicida agrícola de amplio espectro. Combina la acción sistémica y localizada, así como efecto preventivo, curativo y erradicante. Incluye dos diferentes mecanismos de acción.

GRUPO QUÍMICO

Strobilurin y Triazole

FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN

TOQUI es un fungicida agrícola formulado como Gránulos dispersables (WG), que contiene 250 gramos de trifloxystrobin y 500 gramos de tebuconazole por cada Kilogramo de producto formulado.

MODO DE ACCIÓN

TOQUI actúa combina dos modos de acción, uno interfiere la respiración del patógeno, al inhibir la cadena de transporte de electrones y el otro modo interfiere con su desarrollo al interferir con la síntesis de ergosterol.



TOQUI

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.3 - 0.375	-	14	*3.0 **6.0
	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375	-		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	-	30	*1.0 **0.6
Aji Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25	-	3	*0.4 **0.6
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	-	35	*5 **1.5
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.06	60	*0.01 **0.05
Arándano	Oidiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.075 - 0.1	1	*3 **1.5

P.C.: Periodo de carencia (días)

* Trifloxystrobin; ** Tebuconazole

Gasto de agua en alcachofa: 200 a 600 L/Ha

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de Vid aplicar máximo 2 veces por campaña al año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación de campo y del cultivo.
- En el cultivo de Alcachofa, Páprika, Mango y Arándano, aplicar una vez por campaña al año, cuando se ha detectado la plaga en hojas. Cuando la planta está en desarrollo hasta el inicio de la floración.
- En el cultivo de Arroz se recomienda aplicar hasta 2 veces por campaña al año, con un intervalo de 15 días, con aplicaciones dirigidas a las hojas cuando estas muestren síntomas de la enfermedad durante el crecimiento vegetativo hasta el llenado de grano.
- El suelo debe estar en capacidad de campo. La planta debe estar turgente. No debe haber humedad sobre la lámina foliar

TOQUI



RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización.
- Agregar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque.
- Realizar pre mezcla con la dosis a emplear.
- Vierta el agua al tanque hasta completar la cantidad deseada.
- Es sistema de agitación del tanque debe estar en funcionamiento durante la mezcla y la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis y momentos de aplicación indicados, TOQUI No es fitotóxico para los cultivos recomendados

EFFECTO EN CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta a los cultivos siguientes si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.



TOQUI

SEGURIDAD

- No corrosivo, Inflamable, No explosivo.
- MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO. Tiene banda de seguridad de color AMARILLA.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

PRESENTACION

ENVASE	EMPAQUE
100 gr	40 bolsas
1.0 Kg	10 bolsas

- Envase 100 gr.
- 1.0 Kg.
- Empaque 12 unidades