

FICHA TECNICA

DORVOX

FUMIGANTE DE ALTA PENETRACIÓN NO RESIDUAL

DORVOX es un potente y eficaz insecticida fumigante de calidad premium en base a fosfuro de aluminio, capaz de controlar todo tipo de plagas en sus diferentes estados de desarrollo, es decir, su control es sobre huevos, larvas, ninfas, pupas y adultos presentes en productos almacenados.

DORVOX es un fumigante sólido en forma de tabletas, que en contacto con la humedad del medio ambiente se activa liberando fosfuro de aluminio. Este último es un gas altamente tóxico, que es capaz de controlar eficazmente todo tipo de plagas que afectan a productos almacenados.

DORVOX es un producto de uso profesional especializado de fácil y efectiva aplicación, ya que puede utilizarse para la fumigación de productos a graneles, mercaderías en sacos, contenedores y otros, sin alterar la calidad ni el sabor de los productos tratados.

DORVOX es ideal para el control de gorgojos y polillas en granos almacenados, productos terminados, alimento concentrado, frutos deshidratados, cacao, leguminosas y ambientes previamente hermetizados.

DORVOX no presenta periodo de carencia, lo cual permite utilizar el producto tratado luego de ser ventilado adecuadamente.

Composición: Fosfuro de Aluminio 57%

Formulación: Tabletadas redondas de 3 gr.

Modo de acción: Inhalación

Presentación: Envases de 90 gr. y 1.5 Kg.

DOSIS:

Mercadería o Lugar	Dosis	Tiempo de exposición (días)	Ventilación (días)	Modo de aplicación
Granos almacenados, en silos o almacén a granel, arroz, frejoles, pallares, maíz, garbanzos etc.	3 a 5 pastillas por tonelada	Mínimo 3 días	24 horas	Aplicar con Tubos de PVC (Sondas) y cubrir herméticamente con plástico de grosor 10 mm.
Granos almacenados, ensacados en bolsas plásticas bajo enmantado, arroz, frejoles, pallares, maíz, garbanzos etc.	2 a 5 pastillas por tonelada	3 a 5 días	6 a 72 horas	Colocar las tabletas sobre cartones o bandejas de huevos alrededor o debajo de las rumas, se debe dejar espacio entre las tabletas y el plástico o lona de la cubierta para facilitar la generación de gas, luego se procede a hermetizar el plástico con el suelo mediante cintas adhesivas y chorizos de arena.
Pastas, especias y azúcar	2 a 5 pastillas por tonelada	3 a 5 días	6 a 72 horas	
Tabaco en fardos, cajas o barriles	0.5 a 1 pastillas por m ³	4 a 8 días	48 a 72 horas	
Leguminosas (lentejas, frijoles, garbanzos, soya, etc)	3 a 5 pastillas por tonela	Mínimo 3 días	24 horas	
Semillas en sacos, apiladas en rumas, bajo plástico, debidamente encarpadas y hermetizadas.	1 a 2 pastillas por m ³	Mínimo 3 días	6 a 72 horas	Para la fumigación de locales, fábricas y molinos, colocar las tabletas separadas sobre cartones o bandejas de huevos por pisos de acuerdo al volumen y condiciones del lugar.
Estructuras previamente hermetizadas (bodegas, cámaras de fumigación, contenedores, fábricas, industrias, silos de harina y de acopio de grano, etc), tener cuidado de proteger las maquinarias o instrumentos que contengan metales.	1 a 2 pastillas por m ³	Mínimo 3 días	6 a 72 horas	
Alimento balanceado destinado a animales.	2 a 5 pastillas por toneladas	3 a 5 días	6 a 72 horas	Aplicar con Tubos de PVC (Sondas) y cubrir herméticamente con plástico de grosor 10 mm

Recomendaciones de uso:

- Determinar con exactitud los metros cúbicos en los cuales aplicará el fumigante para que no sobre o sub-dosifique.
- Verificar si el lugar a desinsectar se encuentra con o sin producto en almacenamiento.
- Revisar la hermetización efectiva del lugar, ya que la pérdida por pequeñas filtraciones, puede marcar la diferencia en los resultados finales.
- No se recomienda fumigar cuando la temperatura del producto a tratar sea inferior a 4° - 5° C.
- Se deben respetar los tiempos mínimos de exposición indicados por el fabricante.
- Es importante que el gas ocupe todo el volumen y por lo tanto deberá calcularse en función del volumen, aún cuando la mercadería no ocupe todo el espacio.
- Nunca debe ponerse el producto en contacto directo con el agua.
- Sólo personas adultas debidamente instruidas en su manejo y familiarizadas con las medidas de precaución pueden utilizar el producto.
- Debe ser utilizado sólo para la finalidad mencionada en la etiqueta.
- Para la manipulación del producto, al interior y exterior de un recinto, se debe usar máscara de rostro completo con filtro para fosfina.
- No fumigar jamás edificios habitados, ni locales colindantes con viviendas.
- Dejar carteles de advertencia en el lugar de la fumigación, indicando la fecha de inicio y término de la fumigación.
- No permitir el ingreso de personas a los recintos mientras no se haya cumplido el tiempo de ventilación.
- Leer la etiqueta e inserto antes de usar el producto.