

HORTUZE^B

80 WP

Reg. PQUA N° 216 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HORTUZE^B 80 WP es un Fungicida de amplio espectro, previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos.

FORMULACIÓN

HORTUZE^B 80 WP es un fungicida Polvo Mojable (PM), que contiene 800 g de mancozeb por kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Ditiocarbamato.

MODO DE ACCIÓN

HORTUZE^B 80 WP es un fungicida de contacto, que se usa como preventivo.

HORTUZE^B 80 WP inhibe la germinación de las esporas del hongo e inactiva el enlace S — H de enzimas y proteínas permitiendo la acumulación del ácido pirúvico.

HORTUZE

80 WP

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g / cil 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Hielo fungoso o racha	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	28	0.1
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500		
Tomate	Hielo fungoso o racha	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	10	2.0
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500		
Naranja	Podredumbre gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	400 - 500	28	2.0
Algodonero	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria tenuissima</i>	400 - 500	28	2.0
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400 - 500	28	0.2
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	600 - 800	28	0.1
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	600		
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	2.0
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2.0
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	750	14	2.0

PC: Período de Carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.
- El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

HORTUZE^B

80 WP

RECOMENDACIONES

- Se obtienen buenos resultados haciendo pre mezcla con volumen de agua reducido hasta obtener una mezcla uniforme, luego completar el volumen de agua necesario para el tratamiento.
- Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para la aparición de enfermedades o tan pronto se observen los primeros síntomas.
- La aplicación debe realizarse procurando cubrir a toda la planta.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina o que contengan cal.

SEGURIDAD

- Es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado, por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.