Mole Extra®

Reg. PQUA N° 1702 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENEREALES

MOLE EXTRA es un fungicida de contacto que actúa preventiva y curativamente. Protege a una diversidad de cultivos del ataque de Botrytis. Al ser usado en post cosecha, aumenta la vida de anaquel de vid, fresa, flores y otros.

MOLE EXTRA no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendad en una pequeña cantidad de agua, luego remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FORMULACIÓN

MOLE EXTRA es un fungicida formulado como suspensión concentrada que contiene 300 g de fenhexamid y 125 g de fludioxonil por un litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Fenhexamid: Hidroxianilida.
Fludioxonil: Phenylpyrrole.

MODO DE ACCIÓN

MOLE EXTRA, tiene acción sistémica localizada. Interfiere en el metabolismo de síntesis de ergosterol y los transductores de señales; inhibiendo los 4 estados de la enfermedad: Germinación de las esporas, elongación del tubo germinativo, formación del apresorio, crecimiento del micelio.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Mole Extra®

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/200L		
Vid	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	2.0 - 2.5	0.24	7	20 (1) 2 (2)
Mandarina	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	1.5 - 2.5	0.35	14	20 (1) 10 (2)
Arándano	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.3	1	20 (1) 5 (2)
Palto	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.74	0.2	35	0.01 (1) 1.5 (2)
Granado	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.25	1	2 (1) 3 (2)
Limón	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	0.20-0.25	21	0.01 (1) 10 (2)
Pitahaya	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.6 - 0.7	0.3-0.35	73	0.01 (1) 0.01 (2)

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.
(1) Fenhexamid (2) Fludioxonil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En Vid, se recomienda aplicar en floración, cierre de racimos y en cambio de color, como máximo aplicar 3 veces por campaña/año. En Mandarina, se recomienda aplicar al 5% de la floración, aplicar una vez por campaña/año. En Arándano, se recomienda aplicar en floración y en crecimiento del fruto, aplicar 2 veces por campaña/año. En Granado, se recomienda aplicar en floración y en cuando inicia la floración hasta crecimiento del fruto, aplicar 1 vez por campaña/año. En todos los casos que se utilice más de una vez, debe existir un intervalo de 14 días entre la primera y segunda aplicación. En Pitahaya, se recomienda aplicar en floración hasta crecimiento del fruto, aplicar 1 vez por campaña/ año.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Mole Extra®

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MOLE EXTRA puede ser usado solo o en mezclas o con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones. Es compatible con productos de reacción alcalina.

RECOMENDACIONES

- ✓ Aplicar en horas frescas. Evitar temperaturas mayores de 28°C y vientos mayores de 5 km/hora.
- ✓ Evite aplicar cuando exista agua libre sobre la superficie a tratar y cuando haya probabilidad de precipitación.
- ✓ Acondicionar el agua a un pH 5.5 – 6.0.
- ✓ Mantener la solución en constante agitación desde la preparación y durante la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

SEGURIDAD

- ✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- ✓ Es Ligeramente peligroso - cuidado por lo que tiene banda se seguridad de color azul.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Tel 717 - 9040 / 717-9041
E-mail: ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe