

# TOQUI

Reg. PQUA N°2350 – SENASA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**TOQUI** es un fungicida agrícola de amplio espectro. Combina la acción sistémica y localizada, así como efecto preventivo, curativo y erradicante. Incluye dos diferentes mecanismos de acción.

## GRUPO QUÍMICO

Strobilurin y Triazole

## FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN

**TOQUI** es un fungicida agrícola formulado como Gránulos dispersables (WG), que contiene 250 gramos de trifloxystrobin y 500 gramos de tebuconazole por cada Kilogramo de producto formulado.

## MODO DE ACCIÓN

**TOQUI** actúa combina dos modos de acción, uno interfiere la respiración del patógeno, al inhibir la cadena de transporte de electrones y el otro modo interfiere con su desarrollo al interferir con la síntesis de ergosterol.

# TOQUI

## CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.3 - 0.375	-	14	*3.0 **6.0
	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375	-		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	-	30	*1.0 **0.6
Aji Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25	-	3	*0.4 **0.6
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	-	35	*5 **1.5
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.06	60	*0.01 **0.05
Arándano	Oidiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.075 - 0.1	1	*3 **1.5

P.C.: Periodo de carencia (días)

\* Trifloxystrobin; \*\* Tebuconazole

Gasto de agua en alcachofa: 200 a 600 L/Ha

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm)

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TOQUI** máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga.

En el cultivo de Vid, aplicar máximo 2 veces por campaña al año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación de campo y del cultivo.

En el cultivo de Alcachofa, Páprika y Mango, aplicar solo una vez por campaña al año, cuando se ha detectado la plaga en hojas. Cuando la planta está en desarrollo hasta el inicio de floración.

En el cultivo de Arroz se recomienda aplicar hasta 2 veces por campaña al año, con un intervalo de 15 días, con aplicaciones dirigidas a las hojas cuando estas muestran síntomas de la enfermedad durante el crecimiento vegetativo hasta el llenado de

# TOQUI

grano.

El suelo debe estar en capacidad de campo. La planta debe estar turgente. No debe haber una humedad sobre la lámina foliar.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

## RECOMENDACIONES

- Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización.
- Agregar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque.
- Realizar pre mezcla con la dosis a emplear.
- Vierta el agua al tanque hasta completar la cantidad deseada.
- Es sistema de agitación del tanque debe estar en funcionamiento durante la mezcla y la aplicación.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las dosis recomendadas y aplicados en los momentos indicados

## EFFECTO EN CULTIVOS SUCESIVOS

No afecta a los cultivos siguientes si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

# TOQUI

## SEGURIDAD

- No corrosivo, Inflamable, No explosivo.
- MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO. Tiene banda de seguridad de color AMARILLA.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.