



D-MALEX 72SL

Reg. PQUA N° 949-SENASA

FORMULACIÓN

D-MALEX es un herbicida formulado como Concentrado Soluble (SL), que contiene 720 g de 2,4-D Sal Amina por L de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Fenoxiacético.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

D-MALEX es un herbicida hormonal sistémico selectivo para el control de malezas de hojas anchas en cultivos de gramíneas. Las malezas absorben por su tejido alterando y transformando la elaboración de las sustancias de las que las plantas se alimentan.

MODO DE ACCIÓN

El ácido 2,4-D posee una actividad de tipo regulador de crecimiento; bioquímicamente, actúa como el ácido indolacético, es una auxina sintética. El modo de acción primario está relacionado con los ácidos nucleicos y el metabolismo de proteínas cuyas enzimas afectan la plasticidad de las paredes celulares.

D-MALEX 72SL

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maiz	Anisillo	<i>Fumaria capreolata</i>	1.5	7	0.05
	Lechera	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Capuli	<i>Nicandra physalodes</i>			
	Ortiga	<i>Urtica urens</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Malva	<i>Malvatum coromandelianum</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>			
	Paico	<i>Chenopodium album</i>			
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>			
Caña de Azúcar	Paico	<i>Chenopodium album</i>	1.5 - 2	88	0.05
	Papacora	<i>Pitrea cuneato-ovata</i>			
	Trebol	<i>Trifolium repens</i>			
	Hierba blanca	<i>Alternanthera pubiflora</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Uvilla	<i>Physalis peruviana</i>			
	Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Ortiga	<i>Urtica urens</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			

PC: Período de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **D-MALEX** máximo una aplicación por campaña año y en etapa post-emergente temprano de la maleza hasta alcanzar los 5 cm de altura o cuando la planta tenga 6 hojas.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción alcalina fuerte o ácida.

RECOMENDACIONES

- ∇ No aplicar sobre malezas estresadas por sequía.



D-MALEX 72SL

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en el cultivo recomendado, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Los cultivos de algodón, vid, papa, tomate, plantas ornamentales y otros cultivos de hoja ancha, son sensibles al producto.

SEGURIDAD

- ✓ No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- ✓ Es moderadamente Peligroso, por lo que tiene banda de seguridad de color amarillo.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.