

Cigaral[®]

70 WP

Reg. PQUA N° 1440 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CIGARAL 70 WP es un insecticida de última generación que actúa por contacto e ingestión y otorga una larga protección. Actúa especialmente en el control de insectos picadores y chupadores como pulgones, mosca blanca y prodiplosis. Excelente control de vectores de virosis. El producto puede ser absorbido tanto por el follaje como por el sistema radicular, por lo que puede usarse a través de sistemas de riego presurizados o aplicado directamente al suelo (drench).

FORMULACIÓN

CIGARAL 70 WP es un Insecticida formulado como polvo Mojable (WP), que contiene 700 g de imidacloprid por kilo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Cloronicotinílicos

MODO DE ACCIÓN

CIGARAL 70 WP ingresa al insecto por contacto e ingestión. Actúa a nivel del sistema nervioso central bloqueando irreversiblemente los receptores nicotínicos de las neuronas, lo que produce la muerte por cansancio muscular.

Cigaral[®]

70 WP

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	40 - 50	14	0.5
	Pulgón negro	<i>Toxoptera aurantii</i>	50 - 60	14	0.5
Tomate	Caracha	<i>Prodiplosis sp</i>	60 - 80	14	0.1
	Mosca blanca	<i>Bemisia sp</i>	50 - 60	7	0.1
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	80	NC	0.05
Alcachofa	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	50	NC	0.2
Vid	Filoxera	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	40 - 50	NC	0.1
Páprika	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70	NC	NC
Palto	Trips	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	50 - 100	30	0.05
	Mosca blanca	<i>Aleurodicus dispersus</i>	50	14	0.05
Piña	Cochinilla harinosa	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	50	NC	0.05
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	50 - 60	21	0.05
Capsicum annum	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	50	3	1.00
Arveja	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	50	7	1.00
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	25	30	0.05
Maíz	Cigarrita del maíz	<i>Dalbulus maidis</i>	50	28	0.02
Caqui	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	75 - 100	42	0.05
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	80 - 100	1	5
Limón Tahití	Minador de hojas	<i>Phyllocnistis citrella</i>	80 - 100	3	0.9
	Mosca blanca lanuda de los cítricos	<i>Aleurothrixus floccosus</i>	80 - 100		

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

NC= no conocido.

Cigaral[®]

70 WP

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. “No aplicar en época de floración” En limón Tahití, el producto puede aplicarse desde brotación hasta el crecimiento del fruto. La dosis máxima a usar es 0.4 Kg/Ha. Se recomienda 1 aplicación/campaña/año, utilizando la menor dosis cuando la población de la plaga es menor y la mayor dosis cuando es alta la población de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada es después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los insecticidas y funguicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en época de floración, es tóxico para abejas.
- Al momento de la aplicación debe existir una adecuada humedad en el suelo.
- Se recomienda aplicar con un coadyuvante para mejorar la eficiencia de la aplicación.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

Cigara!® 70 WP

ENVASES

- ✓ 50 g
- ✓ 1 Kg
- ✓ 20 Kg