

MITESAC FORTE

Reg. PQUA N° 1989 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MITESAC FORTE es un insecticida que combina las propiedades de Abamectina y bifenthrin. Actúa por contacto e ingestión, tiene un amplio espectro de control. Su efecto sobre los insectos es inmediato y protege a la planta por un periodo adicional.

FORMULACIÓN

MITESAC FORTE es insecticida agrícola formulado como suspensión concentrada que contiene 18 g de abamectin y 75 g de bifenthrin por un litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Abamectin: Avermectinas

Bifenthrin: Piretroide

MODO DE ACCIÓN

MITESAC FORTE, Bifenthrin es el piretroide con mayor persistencia dentro de su grupo, le confiere a la molécula volteo, durante su acción por contacto y mayor persistencia para su acción por Ingestión posterior, cuando los insectos ingieren tejido con esta molécula. Abamectina, actúa por contacto e ingestión y posee un efecto traslaminar, es una molécula con actividad específica como acaricida e insecticida, controla ácaros e insectos, en estados adultos e inmaduros su acción máxima de control (mortalidad) se observa desde los 3 hasta los 7 días posteriores a la exposición de los insectos a la molécula, aunque ni bien toman contacto, quedan inmovilizados y el daño que provocan por alimentación es el mínimo.

MITESAC FORTE

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.15	7	0.01 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.20 - 0.25	1	0.05 ⁽¹⁾ 0.3 ⁽²⁾
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20	7	0.005 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Limite máximo de residuo en ppm.
 (1) Abamectin. (2) Bifenthrin.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña / año dentro de un programa de manejo integrado de plagas y en estadios iniciales de la plaga. En tomate, aplicar una vez por campaña/año, considerando una campaña por año, se aplica cuando la plana está en crecimiento vegetativo; el gasto de agua es 400 – 450 L/ha. En cebolla, aplicar una vez por campaña/año, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MITESAC FORTE Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo.



MITESAC FORTE

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

SEGURIDAD

- ✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- ✓ Es Moderadamente peligroso - dañino por lo que tiene banda de seguridad de color amarilla.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.