

AminoMAX

INGREDIENTE ACTIVO	Aminoácidos de Origen Vegetal
NOMBRE QUÍMICO	Aminoácidos
GRUPO QUÍMICO	Aminoácidos
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Aminoácidos libres..... 10% p/p Nitrógeno total (N)..... 1,6% p/p Fósforo total (P ₂ O ₅)..... 0,5% p/p Potasio total (K ₂ O)..... 0,5% p/p
MODO DE ACCIÓN	Absorción radicular y foliar.
FABRICANTE / FORMULADOR	ANASAC
DISTRIBUIDOR EN CHILE	ANASAC
TOXICIDAD	Se considera no tóxico
ANTÍDOTO	-

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Aminomax se obtiene mediante hidrólisis de proteínas de origen vegetal. Aumenta la resistencia de las plantas a las condiciones adversas como exceso de frío y calor, problemas de fitotoxicidad, plagas o enfermedades. Desempeña un papel fundamental en la fisiología de la planta e interviene en la formación de proteínas.

RECOMENDACIONES DE USO

En general se recomienda dosis de 250 cc por 100 Lt de agua.
Vía riego la dosis por aplicación es de 2 a 8 litros por hectárea, dependiendo con la cantidad de agua que se está aplicando. No aplicar en dilución final menor a 0,02 %.

AminoMAX

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Aplicaciones al Follaje
Vides y Parronales	3 – 5 aplicaciones desde brotes de 20 – 30 cm en cada 20 a 30 días hasta 15 días antes de flor. No aplicar cerca de flor.
Pomáceas y Carozos	3 – 5 aplicaciones desde pre-floración hasta 15 días antes de flor y después de cuaja de frutos.
Cítricos	3 – 5 aplicaciones coincidiendo con los crecimientos radiculares.
Viveros y Ornamentales	3 – 4 aplicaciones desde inicio de crecimiento activo y después cada 15 días.
Tomates	Indeterminado: 3 aplicaciones al inicio del ciclo. Cultivo Botado: 3 aplicaciones al inicio del ciclo.
Melones, Pepinos, Zapallos y Sandías,	3 – 7 aplicaciones durante crecimiento vegetativo.
Lechugas, Coles, Coliflores, Apio	2 – 4 Aplicaciones desde 4 a 5 hojas cada 15 a 20 días.
Porotos, Arvejas, Pimientos	2 aplicaciones antes de pre-floracion

Berenjenas, Papas	3 – 7 aplicaciones con plantas de 30 cm de altura, cada 15 a 20 días. Tratamiento de la semilla (tubérculos) al momento de plantar. Al follaje 3 aplicaciones durante crecimiento vegetativo.
Ajos, Cebollas	3 Aplicaciones desde los 10 cm de altura y después cada 21 días.
Zanahoria	3 Aplicaciones desde el estado de tres hojas y 15 a 20 días después.
Alcachofas	4 aplicaciones comenzando 20 días después de la plantación y cada 20 días.
Remolacha	2 aplicaciones, al estado de 4 a 5 hojas y después cada 15 días en cada corte.
Alfalfa	Varias aplicaciones, 20 días post siembra y después cada 15 días en cada corte.
Césped	Aplicar al inicio crecimiento y continuar con intervalos de 3 o 4 semanas. Adicionalmente después de 3 períodos de estrés o alto tráfico, heladas y resiembra.



AminoMAX

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar contacto con ojos y piel.
Es nocivo por ingestión. No ingerido.
Lavar con agua y jabón después de su aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con la mayoría de insecticidas, fungicidas y abonos foliares.
No mezclar con cobre, ni azufre ni sus derivados. No mezclar con aceites minerales, ni con productos de reacción alcalina.