



094-SENASA. PBA-ACBM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Biofungicida con acción preventiva (en frutales de hoja caduca) y curativa del oidio, a base de la cepa de *Bacillus subtilis* IAB/BS03 de última generación y de coformulantes sólidos sinérgicos especialmente seleccionados para dinamizar su efecto fungicida.

FORMULACIÓN

Polvo mojable (wp)

pH:

8,0±0,5

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO:

Bacillus subtilis (cepa IAB/BS03)0,1 g/kg (garantizado 1 x 10⁶ UFC/g)

Aditivosc.s.p. 1 kg

MODO DE ACCIÓN:

Ospo Vi55 es un fungicida que actúa por contacto, de acción preventiva y curativa que forma una barrera física sobre el área cubierta por el caldo de aplicación.

Ospo Vi55 puede utilizarse para controlar los ataques de hongos causantes de oídios y oidiosis en diversos cultivos como el de uva y algunas hortícolas como la alcachofa. También se aplica para controlar las enfermedades producidas por *Stemphylium sp.* sobre cultivos de espárragos. Se puede aplicar tanto en invernadero como al aire libre.

Ospo Vi55 puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LRM
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.2	2.5-4.5	N.A.	N.A.
Arándano	Oidium	Microsphaera penicillata	1.2	3.6	N.A.	N.A.
Espárrago	Mancha de pera	Stemphylium vesicarium	1.0 - 1.2	2.5 - 3.5	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	1.0	2	N.A.	N.A.
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	1.0 - 1.2	5 - 6	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia - LMR: Límite Máximo de Residuos - N.A.: No aplica

PRECAUCIONES DE USO

Es muy importante adicionar el agua primero en la cuba y disolver la totalidad de la dosis a utilizar en 1/3 del agua requerida. MANTENER EN AGITACIÓN EN EL TANQUE DURANTE UN MÍNIMO DE 15 MINUTOS antes de agregar el resto del agua sin interrumpir la agitación. Dejar el tanque en agitación durante 5 minutos antes de iniciar la aplicación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El número de aplicaciones depende de la gravedad del problema. Se aconseja aplicar entre 2 a 3 aplicaciones por campaña a intervalos de 10-15 días entre aplicaciones. Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

Almacenamiento: No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada.

Compatibilidad: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina.

Toxicología:

- No es tóxico, ni selectivo.
- No produce residuos en los frutos y vegetales.

CERTIFICACIONES ORGÁNICAS

Unión Europea: Anexo II (CE) n°834/2007 y n°889/2008
EE.UU.: USDA/NOP - final rule





OBSERVACIONES:

- Lea detenidamente el contenido de la etiqueta del envase.
- El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo.

DISTRIBUIDO POR: Hortus, S.A. Calle Sucre 270, Ate, Perú
Tel.: (+51) 17179040 / (+51) 17179041. www.hortus.com.pe