

COMPOSICION

Oxido de Calcio (CaO) complejado totalmente soluble en agua
Boro (B) totalmente soluble en agua

%p/p
8.00
1.00

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Manvert Cab Tracker es un fertilizante foliar líquido, que aporta calcio y boro a los cultivos y corrige las deficiencias de estos elementos.

Manvert Cab Tracker debido a sus especiales características de formulación, es idóneo para la aplicación por vía suelo, pulverización foliar (normal o ULV) y en cualquier sistema de fertirrigación (cinta, aspersión, goteo, microjet, pivote, etc).

Manvert Cab Tracker formulado como un complejo natural es absorbido tanto por los estomas de las hojas como por el sistema radicular.

Manvert Cab Tracker es compatible con otros productos fitosanitarios, abonos (suspensiones y soluciones NK), abonos foliares, insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Manvert Cab Tracker se dispersa en agua mediante agitación adicionando posteriormente el pesticida.

Manvert Cab Tracker no es fitotóxico.

Es un producto ideado para aportar calcio y boro de manera conjunta a los cultivos que lo necesiten, especialmente aquellos en los que es fácil encontrar desequilibrios debido a la falta de uno de los dos elementos y al exceso de otro.

Esta especialmente indicado para evitar la podredumbre apical del tomate, fresa y sandía, el bitter-pit en manzana y el corazón negro en remolacha, colinabo, nabo, espárragos, leguminosas, etc. También es recomendable en todos aquellos cultivos en los que el boro forme parte básica de nutrición como alfalfa.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Su uso está recomendado en todos los cultivos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

CULTIVOS	FOLIAR cc/200L	SUELO L/Ha	RIEGO árbol cepa o planta	L/Ha
FRESA	400-600	2-4	3-5 L/Ha	4-8
CÍTRICOS	400-800	2-4	100-250 cc	3-8
FRUTALES (Hueso y pepita)	400-1000	2-4	100-250 cc	4-8
VID	400-800	1-3	50-150 cc	2-8
OLIVO	600-1000	3-6	150-300	5-15
HORTICOLAS	600-1000	2-3	2-5 cc	2-8
CEREALES		1-3	3-5 L/Ha	2-8
LEGUMINOSAS		2-5	3-5 L/Ha	2-8
FORRAJERAS e INDUSTRIALES	600-1000	2-5	3-5 L/Ha	2-8
FLORALES y ORNAMENTALES		2-5	2-10 L/Ha	2-8
MAÍZ	400-600		50-100	
ARROZ	400-600			

Tratar cuando el cultivo este en crecimiento activo, con preferencia después de la lluvia o riego. Pulverizar por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar la dosis indicada.

CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de los alimentos, bebidas. No ingerir el producto.

Lavarse con agua y jabón tras su manipulación.

No apilar un palet sobre otro. Margen de temperaturas recomendado para el almacenaje del producto: +5°C a +35°C.

El intervalo de pH en que se garantiza la estabilidad de la fracción complejada es 3-7

Este producto no esta sujeto a ninguna norma toxicológica ni para su manejo ni para su aplicación.

La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.