



# Fenolic

FOSFITO DE POTASIO

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| INGREDIENTE ACTIVO          | Abono Líquido a base de Fósforo y Potasio. |
| NOMBRE QUIMICO              | Fosfito de Potasio                         |
| CONCENTRACION Y FORMULACION | 32% p/p $P_2O_5$<br>21% p/p $K_2O$         |
| MODO DE ACCION              | Absorción Foliar y radicular.              |
| TOXICIDAD                   | Se considera no tóxico                     |
| ANTIDOTO                    | No requiere                                |

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**PK 3221®** es un abono a base de Fósforo y Potasio, que además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo **PK 3221®** puede ser aplicado vía foliar o bien al suelo. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos. Es compatible con la mayoría de los fungicidas de uso común, salvo caldo bordelés.

# Fenolic

FOSFITO DE POTASIO

## INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO                              | DOSIS                     |                 | OBSERVACIONES                                                |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      | FOLIAR<br>(cc/200 L agua) | SUELO<br>(L/ha) |                                                              |
| Hortalizas                           | 600 - 700                 | 7 - 8           | 3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción                 |
| Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )    | 400 - 600                 | 6 - 8           | 3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción                 |
| Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )        | 1000-1200                 | ---             | Aplicar al momento de llenado de grano                       |
| Frutales                             | 400 - 600                 | 6 - 8           | 3 aplicaciones en épocas de brotación nuevas.                |
| Cítricos ( <i>Citrus spp.</i> )      | 400 - 600                 | 6 - 8           |                                                              |
| Aguacate ( <i>Persea americana</i> ) | 400 - 600                 | 6 - 8           |                                                              |
| Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )        | 600 - 1000                | 7               | 2 a 3 aplicaciones desde brotación a cosecha                 |
| Olivo ( <i>Olea europea</i> )        | 600 - 1000                | -               | 3 aplicaciones entre prefloración y receso o caída de hojas. |
| Ornamental                           | 600                       | 7,5             | Aplicar cada 20 días en época de receso.                     |

## PRECAUCIONES

Aplicar con ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos. Después de usar el contenido de este producto, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por la autoridades locales para este fin.



# Fenolic

FOSFITO DE POTASIO

## COMPATIBILIDAD

**PK 3221®** Es incompatible con aceites minerales, compuestos cúpricos y productos muy alcalinos además de dimetoato y dicofol. Esperar al menos 20 días entre su aplicación y la de productos con incompatibilidad. En caso de dudas sobre la compatibilidad consulte a **ANASAC**.

## MEDIOAMBIENTE:

No es peligroso siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. No es tóxico para abejas, aves, peces u otros animales usando la dosis recomendada. Evitar contaminar fuentes de agua, no es fitotóxico en las dosis recomendadas. Se debe destruir o inutilizar los envases vacíos. En caso de derrame cubrir con material absorbente y luego desechar.

**“Toda la información entregada en este sitio es de índole informativa y referencial, por lo que la recomendación final de su uso debe ser siempre realizada por un especialista en el área consultada”**