Tronkal

Reg. PQUA N° 1353 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRONKAL es un fungicida sistémico y translaminar, que posee acción preventiva y curativa, así como antiesporulante y erradicante, en las dosis recomendadas. Tiene acción prolongada de protección y amplio espectro de acción,

FORMULACIÓN

TRONKAL es un fungicida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 200 g de Azoxystrobin y 125 de Difenoconazole, por L de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Azoxystrobin: Estrobilurina
Difenoconazole: Triazoles

MODO DE ACCIÓN

TRONKAL actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol del hongo.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Tronkal

CUADRO DE USOS

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	-	0.50	7	3 (1) 3 (2)
Páprika	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.30	7	3 (1) 0.9 (2)
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	-	0.45	14	7 (1) 7.3 (2)
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	0.2	0.4	100	0.01 (1) 0.05 (2)
Mandarina	Alternaria	*Alternaria alternata*	0.1	0.4	7	15 (1) 0.6 (2)
Granado	Alternaria	*Alternaria alternata*	-	0.3	26	0.01 (1) 0.1 (2)
Cebolla	Punta seca	*Stemphylium vesicarium*	-	0.3	7	10 (1) 0.5 (2)
Arroz	Quemado	*Pyricularia oryzae*	-	0.5	44	5 (1) 3 (2)
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	-	0.5	28	0.01 (1) 0.6 (2)
Alcachofa	Oidium	*Leveillula taurica*	-	0.40	7	5 (1) 1.5 (2)
Mango	Oidiosis	*Oidium mangiferae*	-	0.5	21	0.7 (1) 0.1 (2)
Arándano	Mancha negra de la hoja	*Alternaria alternata*	0.2	-	7	0.5 (1) 4 (2)
Fresa	Oidiosis	*Podosphaera aphanis*	-	0.3-0.4	1	10 (1) 2.5 (2)
Pitahaya	Pudrición suave de la penca	*Pectobacterium carotovorum*	0.25	-	7	0.3 (1) 0.3 (2)
Mango	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.1-0.15	-	15	4.0 (1) 0.1 (2)

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.
(1) LMR: Azoxystrobin (2) LMR: Difenoconazole

Fecha de actualización: 30/08/2025

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / **www.hortus.com.pe**

Tronkal

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En Arándano, puede realizarse 2 aplicaciones por campaña/ año con un intervalo de 14 días. En Fresa puede realizarse 2 aplicaciones por campaña /año. En Pitahaya puede realizarse 2 aplicaciones por campaña /año, considerando una campaña por año, con un intervalo de 15 días. No use en forma consecutiva, En Mango puede usarse 2 aplicaciones por campa/año con un intervalo de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos con ph mayor a 11 o menor a 2.
Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes

RECOMENDACIONES

- Aplicar en forma PREVENTIVA.
- Dar buena cobertura de aplicación.
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción.

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.

Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe