

Folplex Inicio

DESCRIPCION

Folplex Inicio es un nutriente foliar líquido con alto contenido de Nitrógeno, 100 % bioasimilable por los cultivos. Gracias a su avanzada formulación permite el aporte de aminoácidos lo cual facilita la asimilación de nutrientes.

Folplex Inicio aporta ácidos fúlvicos y aminoácidos (ambos de origen vegetal), los que actúan como transportadores y penetrantes, incrementando así la eficiencia de aquellos productos que lo acompañen, estos además producen incrementos sobre los niveles de sacarosa en las plantas lo que genera un mejor sabor en los frutos, lo que se traduce en una mejora de la calidad de la cosecha.

Folplex Inicio previene la reducción de la planta tanto en el tamaño como en la velocidad de su desarrollo, pues en ausencia de este macroelemento primario, la planta, suele tener a un color más amarillo, sus ramas se quedan más cortas de lo normal en el tiempo, de forma muy erguida y leñosa, sus entrenudos y hojas son de menos envergadura

COMPOSICIÓN

Nitrógeno	30.00 %
Calcio	0.30 %
Magnesio	1.50 %
Hierro	0.16 %
Manganeso	0.08 %
Zinc	0.30 %
Cobre	0.08 %
Boro	0.25 %
Ácido Carboxílico	6.00 %
Ácido Fúlvico	1.00 %
Aminoácidos	4.00 %

Folplex Inicio

FORMULACIÓN

Concentrado Soluble (SL)

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivos	Dosis (200 L)	Forma y Momento de aplicación
Café	0.5-1 L	1ra. Inmediatamente antes de la floración. 2da. Inmediatamente después del cuajado.
Arroz	0.5-1 L	1ra. En el punto de algodón (preñez). 2da días después de la 1ra. aplicación.
Cebolla y Ajo	0.5-1 L	Aplicar 2 a 3 veces desde el inicio del desarrollo vegetativo, repitiendo cada 20 días.
Col, lechuga, brócoli, tabaco	0.5-1	Aplicar 2 a 3 veces desde el inicio del desarrollo vegetativo, repitiendo cada 20 días.
Cucurbitáceas Melón, sandía, pepino	0.5-1	1ra. En la floración. 2da. Después del cuajado.
Frutales	0.5-1	1ra. Antes de la floración. 2da. Luego del cuajado de la tierra.
Espárrago	0.5-1	Al inicio del periodo vegetativo. Repetir en caso de amarillamiento (clorosis)
Papa	0.5-1	1ra. Al inicio de la tuberización (antes del 1er. aporque) 2da. A los 20 ó 25 días de la 1ra. Aplicación (antes del 2do. aporque)
Maíz	0.5-1	A los 20 a 30 días de la siembra, cuando el maíz tenga entre 15 a 30 cm.
Tomate, ají	0.5-1	1ra. Antes de la floración. 2da. Inmediatamente luego del cuajado.
Leguminosas: soya, frijol	0.5-1	1ra. Antes de la floración. 2da. Inmediatamente luego del cuajado.
Vid	0.5-1	Inmediatamente luego del cuajado (En el estado de palo de fósforo)

Folplex Inicio

COMPATIBILIDAD:

Folplex Inicio compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas de uso común. Se recomienda antes de realizar la mezcla, hacer una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendado.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:

Mantener en envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco, lejos de alimentos, animales y niños.

Estable en condiciones normales de almacenamiento.

ENVASES:

Envase de 1 L