



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**MANVERT FOLIPLUS** es un producto que contiene gran cantidad de aminoácidos libres actuando como un potente activador del crecimiento vegetativo frente accidentes fisiológicos (por heladas, sequías fitotoxidades, etc).

Para mejorar su eficacia, contiene extracto de algas, además 0.5% de ácido fólico, 6.9% de aminoácidos libres y 11.5% de azúcares reductores los cuales potencian en gran medida el efecto de los aminoácidos. Estimula el desarrollo de los cultivos en etapas de brotación, floración, cuajado y crecimiento de frutos, raíces y tubérculos.

| COMPOSICIÓN                                  | %p/p | % p/v |
|----------------------------------------------|------|-------|
| Aminoácidos libres                           | 6.0  | 6.9   |
| Extracto de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> | 15.0 | 17.3  |
| Azúcares reductores                          | 10.0 | 11.5  |
| Ácido Fólico                                 | 0.4  | 0.5   |

## SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIONES

En el tanque de aspersión o tanque auxiliar deposite agua limpia por lo menos hasta la mitad. Luego agregue la cantidad indicada del concentrado soluble agitando fuertemente la mezcla mientras efectúa la operación, después complete con agua hasta completar el volumen final.



En combinación con mezclas a base de agua, fertilizantes o plaguicidas, mezcle en el siguiente orden:

1°: Agua

2°: MANVERT FOLIPLUS

3°: Plaguicida

## CUADRO DE USOS

| Cultivo       | Momento de Aplicación                                           | Dosis   |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|               |                                                                 | L/Ha    | L/200L      |
| Vid           | Desde Brotamiento hasta cuaja                                   | 1.5 - 2 | 0.5         |
| Arándano      | Desde Brotamiento hasta cuaja                                   | 1 - 2   | 0.5 - 1     |
| Palto         | Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto                         | 1 - 3   | 0.5         |
| Mandarina     | Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto                         | 1 - 3   | 0.5         |
| Limón         | Crecimiento Vegetativo, Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto | 1 - 2   | 0.5         |
| Alcachofa     | Inducción floral, formación de capítulos                        | 1 - 2   | 0.5 - 1     |
| Mango         | Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto                         | 1 - 2   | 0.5         |
| Cebolla       | Formación y desarrollo de bulbo                                 | -       | 0.5 - 1     |
| Arroz         | Macollamiento y Etapa reproductiva                              | -       | 0.25 - 0.75 |
| Papa          | Estoloneo y llenado de tubérculo                                | -       | 0.25 - 1    |
| Maíz          | Crecimiento vegetativo (V4 - V5)                                | -       | 0.5 - 1     |
| Piña          | Floración - Crecimiento de fruto                                | -       | 0.5 - 1     |
| Pitahaya      | Floración y formación de fruto                                  | 1 - 1.5 | 0.5 - 1     |
| Ajo           | Floración y desarrollo de bulbo                                 | -       | 0.5         |
| Espárrago     | Brotamiento - Maduración                                        | -       | 0.5         |
| Cucurbitáceas | Crecimiento Vegetativo, Floración, Cuaja y Crecimiento de fruto | -       | 0.5         |
| Hortalizas    | Crecimiento Vegetativo                                          | -       | 0.5         |

Se puede aplicar entre 2 a 5 veces por campaña



### **COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes de uso común aplicados al suelo por fertirriego y por vía foliar.

### **FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las dosis aquí dadas.