

MITIGEN

REGISTRO PQUA N° 4524 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MITIGEN es un fungicida de acción preventiva y curativa. Su mecanismo de acción es sobre la biosíntesis de esteroides actuando en varios puntos de la ruta metabólica de los esteroides.

FORMULACIÓN

MITIGEN es un fungicida formulado como Concentrado Emulsionable (EC), que contiene 500 g de spiroxamine por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Spiroketalaminas

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Ligero olor característico

pH: 7 - 10

Densidad relativa: 0.931 (20°C)

Punto de inflamación: 108 °C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad: 2 años

MODO DE ACCIÓN

Actúa sobre la biosíntesis de los esteroides (en varios puntos de su ruta metabólica).

MITIGEN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MITIGEN se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis (L/cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.12-0.14	35	0.6

P.C: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones cuando haya síntomas de la enfermedad en campo. Para el cultivo de vid realizar como máximo una aplicación por campaña/ha/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envases X 1Litro