

ANAZOLE
360 SL

Reg. PQUA N° 3476 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANAZOLE 360 SL es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, tiene alta actividad fungistática. Es absorbida fácilmente por las raíces y conducida acropétalmente a través del Xilema. Promueve el desarrollo radicular de las plantas tratadas.

FORMULACIÓN

ANAZOLE 360 SL es un fungicida formulado como Concentrado Soluble (SL), que contiene 360 g de Hymexazol por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Oxazole.

MODO DE ACCIÓN:

ANAZOLE 360 SL Actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos (RNA y DNA), lípidos y aminoácidos, afectando el crecimiento micelial de los hongos que causan las enfermedades. Así mismo estimula la producción de fitohormonas reguladoras del crecimiento en las plantas y de fitohormonas de defensa a patógenos fungosos.

CLASIFICACIÓN FRAC:

A3: Síntesis ADN/ARN – Grupo 32 heteroaromáticos

ANAZOLE[®]

360 SL

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arándano	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1 - 2	1	0.1
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1 - 2	1	0.05
Vid	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2	8	0.02
Tomate	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 2	1	0.02
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2	27	0.02
Piña	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	2	3	0.02
Alcachofa	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	1.2 - 2	1	0.02
Cebolla	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	2	1	0.02
Páprika	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	2 - 3	1	0.02

Regulador de Crecimiento de plantas (RCP)

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
Palto	Activador radicular	1 - 2	1	0.1

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En arándano, palto, vid, tomate, mango, piña y páprika se recomienda realizar una aplicación por campaña, considerando una campaña por año. En tomate y piña, se usa de preferencia en estado de crecimiento vegetativo hasta crecimiento de fruto. En mango, usar preferentemente cuando la planta está en estado de brotación o floración. En palto, puede usarse antes de iniciar el flash radicular. En Alcachofa y cebolla realizar un máximo de dos (2) aplicaciones por ciclo de cultivo (límite máximo: dos aplicaciones por año). Respetar un intervalo de 15 días entre aplicaciones. Aplicar en drench. Se recomienda realizar la aplicación durante el establecimiento del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al campo tratado, después de 24 horas de realizada la aplicación.



ANAZOLE[®]
360 SL

COMPATIBILIDAD

ANAZOLE 360 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

SEGURIDAD

- ✓ Nocivo en caso de ingestión
- ✓ Nocivo en contacto con la piel
- ✓ Nocivo si se inhala
- ✓ Nocivo para organismos acuáticos
- ✓ Etiqueta color Azul: Atención

PRESENTACIÓN

Envase: 1 L

Empaque: 12 envases