

QELPO™

CARACTERÍSTICAS GENERALES

QELPO™ es una bioestimulante a base de una mezcla de extractos de algas pardas. Estos componentes bioactivos son claves para iniciación y crecimiento radicular, lo que asegura una amplia gama de bioactividad. **QELPO™** influye positivamente en la interacción planta – suelo al asistir el crecimiento de raíces, la absorción y asimilación de nutrientes, fuente de carbono para microorganismos, al mismo tiempo que apoya el desarrollo foliar.

FORMULACIÓN Y APARIENCIA

Solución concentrada de color naranja oscuro a marrón

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Extracto de algas marinas 43% p/p

Ecklonia maxima, *Ascophyllum nodosum* y *Durvillea potatorum*

Salmonella spp: Ausente

Escherichi coli: Ausente

Parámetros fisicoquímicos
Bx = 6.8 ± 7.30
pH = 3.9 ± 0.2
Densidad (@ 20°C) = 1.02 – 1.06

QELPO™

CUADRO DE USOS

Cultivos	Dosis	Observaciones
Uva de mesa	5 - 10 L/ ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Vides viníferas y pisqueras	5 - 10 L/ ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Paltos	10 - 15 L/ ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Mandarinos, naranjos, limoneros, pomelo, tangelos	10 - 15 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Arándanos, frambuesas, frutillas, moras, cranberry, zarzaparrilla	5 - 10 L/ ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Olivos	5 - 10 L/ ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular 2 a 4 aplicaciones con intervalo de 20 - 30 días
Tomates, pimientos, ají, berenjenas, pepino dulce	4 - 6 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular
Repollo, coliflor, brócoli, repollito de bruselas, rabanito	4 - 6 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular
Cebollas, ajos, puerros, chalota, ciboulette, bunching	4 - 6 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular
Melones, sandías, pepinos, zapallito italiano, zapallo guarda	4 - 6 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular
Arvejas, habas, poroto verde y granado, porotos, garbanzos y lentejas	4 - 6 L/ha	Aplicación por sistema de riego en periodo de crecimiento radicular
Trigo panadero, trigo candeal, avena, cebada, triticale	3 - 5 L/ha	Aplicar al suelo en la etapa de crecimiento
Maíz	3 - 5 L/ha	Aplicar al suelo en la etapa de crecimiento
Papas	4 - 6 L/ha	Aplicar al suelo en la etapa de crecimiento
Inmersión de plantas de trasplante	2 a 3 L / 100 L de agua	Inmersión junto a fitosanitario para protección de raíces

MODALIDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
	L/500Kg semilla	
Impregnación de semillas	2	No almacenar semillas tratada

QELPO™

INSTRUCCIONES DE USO

- Para una mejor absorción, rocíe temprano en la mañana o en la noche, evitar rociar con temperaturas altas del día
- Use ropa protectora adecuada cuando se rocíe con otros productos
- Para obtener resultados óptimos, QELPO™ debe usarse en un programa y en combinación con otros fertilizantes balanceados
- Agite bien antes de usar. Mezcle siempre QELPO™ con cantidades suficientes de agua. Nunca aplique QELPO™ sin diluir. Siga los procedimientos estándar de mezcla en tanque.
- No almacene el producto mezclado por mas de 8 horas.
- No mezcle QELPO™ con productos que contengan azufre y/o fosfato.
- No aplique sobre frutas húmedas o cuando las plantas estén bajo estrés hídrico o por calor, o durante condiciones ambientales frescas y húmedas.
- No rocíe QELPO™ dentro de los 30 días posteriores a la aplicación de cualquier producto que contenga cobre.

COMPATIBILIDAD

Es aconsejable hacer una prueba de miscibilidad antes de mezclar con otras sustancias químicas y consultar con un distribuidor de sustancias químicas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las dosis aquí dadas.

QELPO™

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión, consulte con un médico.
- No almacene en la luz solar directa. Almacene el producto en el interior a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Bidones de 20