



CARACTERÍSTICAS GENERALES

AGRO-K® Amino es un nutriente para aplicación foliar con una alta concentración de fósforo y potasio. La formulación de **AGRO-K® Amino**, con la adición de L-aminoácidos además de extractos de origen orgánico, proporciona múltiples beneficios en el desarrollo y rendimiento de las plantas. Los L-aminoácidos son elementos estructurales de los cuales están hechas las proteínas. Algunas de estas proteínas son enzimas, cuya función más importante es regular el metabolismo celular.

La adición con de L-aminoácidos en formulación de **AGRO-K® Amino**. Permite a la planta formar proteínas de manera rápida y con menor gasto de energía. Este ahorro de energía favorece un mejor balance entre la fotosíntesis y la respiración, así como una mayor asimilación de nutrientes contenidos en **AGRO-K® Amino** en favor de cultivos más productivos.

AGRO-K® Amino está especialmente diseñado para aplicaciones a partir del amarre de fruto como promotor del tamaño y la calidad que demandan los mercados exigentes. Por mejores resultados sugerimos aplicar el **AGRO-K® Amino** junto con el bioestimulante Maxi-Grow Excel a sus dosis recomendadas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	%p/p
Fósforo (P_2O_5)	32.0
Potasio (K_2O)	53.0
L-aminoácidos	3.0
Extractos Orgánicos	2.0
Inertes	10.0

ASPECTO FÍSICO

Polvo soluble



RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar		
Cultivo	Dosis * Kg/ha	Observaciones
Alfalfa	1 a 5	A los doce días después de cada corte.
Algodón	1 a 4	Desde poco antes del papaloteo, seguir asperjando cada 15 o 20 días.
Café	3 a 4	Hacer 2 ó 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y prefloración.
Chile, Tomate, Berenjena	1 a 4	De 3 a 5 aplicaciones, según el ciclo de cada cultivo. Para almácigos, asperjar una solución al 0.3% por las tardes.
Papa	2 a 4	Durante el primer tercio del ciclo, con 2 a 4 aplicaciones.
Frijol, soya, garbanzo, chícharo	1 a 3	A los 30 días, a los 55 días y en vaina verde.
Fresa	2 a 4	Cuando haya suficiente follaje después del trasplante, en floración y cada 15 días durante el período de producción.
Frutales	3 a 6	Hacer 3 o 4 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y prefloración.
Maíz y Sorgo	1 a 4	3 aplicaciones: en desarrollo, en prefloración y al inicio del llenado.
Melón, Pepino, Sandía, Calabaza	1 a 4	Asperjar en 3 o 4 ocasiones, iniciando a los 30 días, siguiendo con intervalos de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Papaya	1 a 4	Aplicaciones cada 2 meses.
Piña	3 a 5	De 3 a 5 aplicaciones, durante la pre inducción floral.
Plátano	2 a 3	Aplicaciones cada 2 meses.
Trigo, Avena, Cebada, Arroz	1 a 3	De 1 a 2 aplicaciones, durante el desarrollo vegetativo.
*La variación de la dosis obedece principalmente al grado de desarrollo del cultivo.		



COMPATIBILIDAD

Este producto no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones y puede combinarse con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común. Para mayor seguridad, recomendamos siempre hacer pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las dosis aquí dadas.

ALMACENAMIENTO:

No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa, forraje. No se reutilice este envase, destrúyase.

Almacene en lugar seco y fresco.

No se deja a la intemperie ni al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

1 y 10 Kg